

No	05042	レジメン名	Pembrolizumab+[CBDCA+PAC→EC]			クール	3週間								
領域	乳腺	対象	乳がん(HR陰性、HER2陰性 ハイリスク)			サイクル	術前術後で1年間								
レジメン	【Pembrolizumab(3週毎、術前8回まで(CBDCA+PAC併用4サイクル→EC併用4サイクル)、術後単剤で9サイクルまで)】														
	抗がん薬	商品名	投与量	単位	投与法	投与日									
						1	2	8	9	15	16	21
	1	Pembrolizumab	キイトルーダ	200	mg/body	DIV	day	●							
	【CBDCA+PAC(3週毎×4サイクル)、Pembrolizumabと併用】														
	抗がん薬	商品名	投与量	単位	投与法	投与日									
						1	2	8	9	15	16	21
	1	CBDCA	カルボプラチン	1.5	AUC	DIV	day	●		●		●			
	2	PAC	パクリタキセル	80	mg/m ²	DIV	day	●		●		●			
	【EC(3週毎×4サイクル)、Pembrolizumabと併用、CBDCA+PAC 4サイクル終了後より開始】														
抗がん薬	商品名	投与量	単位	投与法	投与日										
					1	2	8	9	15	16	21	
1	EPI	エピルピシン	90	mg/m ²	DIV	day	●								
2	CPA	エンドキサン	600	mg/m ²	DIV	day	●								